

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	REJENERASYON PROTOKOLÜ			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu SHB.YD.50	Yayın tarihi 19.12.2024	Revizyon No 0	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 3

REJENERASYON PROTOKOLÜ

İlk randevu

- + Adrenalinli lokal anestezi uygulanır.
- + Rubber dam ile izolasyon sağlanır.
- + Giriş kavitesi açılır.
- + Düşük konsantrasyon (%1,5) NaOCl ile her kanal 20 ml ve 5 dakika yıkanır.
- + Salin veya EDTA (%17) ile her kanal 20 ml ve 5 dakika yıkanır.
- + Yıkama boyu kanal boyundan 1 mm eksik olmalıdır.
- + Kanallar kurutulur.
- + Kanallara düşük konsantrasyon antibiyotik patı yada kalsiyum hidroksit yerleştirilir.

İkinci randevu

- + 1-4 hafta sonra hasta çağırılır.
- + Vazokonstrüktörsüz lokal anestezi uygulanır.
- + Rubber dam ile izolasyon sağlanır.
- + EDTA (%17) ile her kanal 20 ml ve 5 dakika yıkanır.
- + Fizyolojik salin ile her kanal 20 ml ve 5 dakika yıkanır.
- + Kanallar kağıt konlar ile kurutulur.
- + 20 K tipi eğe ile 2 mm taşkın kullanılarak mine-sement bileşimine kadar kanama sağlanır. Kanama olmaması durumunda PRP ,PRF gibi otolog fibrin matrisleri kullanılır.
- + Salin ile nemlendirilmiş pamuk pelet kanama üzerine 10-15 dakika boyunca tampon yapılarak kanama durdurulur.
- + Kalsiyum silikat içerikli materyal pıhtının üzerine 3-4 mm kalınlığında kanal içi koronal bariyer olarak kanal sistemi içerisine yerleştirilir.
- + Sertleşmenin tamalanmasının ardından 3-4 mm cam iyonomer siman olarak yerleştirilir.

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Sorumlusu	Onaylayan Dekan
-------------------	--	---------------------------

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	REJENERASYON PROTOKOLÜ			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu SHB.YD.50	Yayın tarihi 19.12.2024	Revizyon No 0	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2 / 3

--	--	--

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	REJENERASYON PROTOKOLÜ			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu SHB.YD.50	Yayın tarihi 19.12.2024	Revizyon No 0	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 3 / 3