

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	ORTODONTİ ANABİLİM DALI AD PEKİŞTİRME PROTOKOLÜ			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu HD.FR.146	Yayın tarihi 21.09.2018	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 30.05.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

Pekleştirme tedavisi; Ortodontik tedavi sonrası elde edilen durumun kalıcılığını sağlamak için gerekmekte ve bir takım apareyler ile yapılmaktadır. Bu dönemde başarılı olabilmek için hastamıza ve yakınlarına bazı tavsiyelerimiz olmaktadır. Bunlara Uyulmadığı takdirde dişlerde geri dönmeler olmaktadır. Bu gibi yan etkilerden kaçınmak için aşağıdaki tavsiyelere uyulması gerekmektedir.

1. Hareketli aparey 24 ay 3 ayrı dönem şeklinde kullanılacak

A: İlk 8 ay (0-8 ay) günde 24 saat kullanılacak

B: İkinci 8 ay (8-16) akşam 08.00 – sabah 08:00 saatleri arası kullanılacak

C: Üçüncü 8 ay (8 ay – 24 ay) iki gecede bir akşam 08:00 – 08:00 saatleri arası kullanılacak, bu dönem sonrasında aparey bırakılacak.

Dişler arkasına yapıştırılan teller mümkünse ömür boyu ağızda kalacak.

2. Dişler arkasına yapıştırılan teller üzerine sert bi cisim ya da gıda maddesi getirilmeyecek ve koparılmayacak.

3. Tel için kullanılan yapışkan erimesine sebep olan sitrik asitli içecekler içilmeyecek.

4. Takıp çıkarılabilen aparey verilen kutu içerisinde saklanacak, yemek yenildiği sırada peçeteye sarılmayacak bu şekilde kaybolması ve kırılması önlenecektir.

5. Aparey diş fırçası ile her gün fırçalanarak temiz tutulacak.

6. Aparey ağızda iken yemek yenmeyecek, yemek yeme esnasında çıkartılacak

7. Hastamız kontrollerine düzenli gelecektir.

Ömür boyu güzel bir gülümseme için...

TARİH :

HASTANIN AD SOYADI:

HASTANIN T.C. No:

VELİSİNİN ADI SOYADI:

İMZA :