

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	DİŞ ETİ CERRAHİSİ ĞİNGİVEKTOMİ-ĞİNGİVOPLASTİ- KRON BOYU YÜKSELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BEGESİ			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu HD.FR.40	Yayın tarihi 25.10.2017	Revizyon No 0	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/2

Diş Hekiminin Tedavi öncesi ve sırasında genel tıbbi durumunuzu bilmesi hayati önem arz etmektedir. Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan bir rahatsızlığınız var ise; kutucuklara (X) işareti koyunuz.

İlaç Alerjisi		Kalp-Damar Hast.	
Tansiyon		Diabet	
Kan hastalığı		Kanser Tedavisi	
AIDS, Zührevi Hst.		Radyoterapi	
Astım		Hepatit	
Epilepsi		Böbrek Hast.	

Bu formda kliniğimizde size ve yakınınıza yapmış olduğumuz muayene ve tetkikler sonucunda planlanan tedavi işlemleri gerçekleştirilmiş olup; onay vermeniz halinde uygulanacaktır.

İŞLEM YAPILACAK DİŞ/DİŞLER															
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

1-ĞİNGİVEKTOMİ VE ĞİNGİVOPLASTİ

İşlemi Kim, Nerede, Ne Şekilde, Nasıl Uygular: Diş Hekimi, Diş kliniğinde, steril malzemeler ile cerrahi kurallara uygun bistürü veya lazer işlem yapılır. Lokal anestezi altında diş etlerinin küçültülüp kesilmesidir. Uygulama Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri gözetiminde Stajer Diş Hekimleri tarafından da yapılabilir.

İşlemin Tahmini Süresi: 30-60 dakika

İşlemden Beklenen Faydalar: Sağlıklı (boyut,renk ve kıvamında) dişetlerine kavuşma, kanamanın azalması, kötü koku çığneme problemlerinin ortadan kalkması, estetiğin düzeltilmesidir.

Varsa işlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri; bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri: Alternatif tedavi yoktur.

İşlemin Riskleri ve Muhtemel Komplikasyonlar : Ağrı, şişlik, enfeksiyonun yayılması, dişlerde ve çevre dokularda his kaybı, komşu dişte harabiyet diş/dişlerin kırılması, dişin veya kırık parçanın değişik anatomik lokalizasyonlara iletilmesi diş eti ve mukoza yaralanmaları, alveoler kemiğin kırılması çenenin çıkması/kırılması, solunum yoluna diş veya yabancı cisim kaçması sinirlerin geçici/kalıcı zarar görmesi, sinüsün perforasyonu olması, çene ekleminin travmaya uğraması, çene açmada kısıtlılık, çenede ve ağız kenarlarında ezikler ve morluklar.

Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği: Ağız solunumu, kötü ağız bakımı, bazı ilaçlar (antihipertansif gibi) dişeti büyümesine neden olur. Bu büyümeler tedavi edilmezse dişin tamamını kaplar; fonksiyon ve estetik kaybına neden olur.

İşlemin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler sonuçları:

Diş eti büyümesinin artması, ağrı, kanama, çığnemede zorlanma, ağız kokusu, estetik problemlerdir. Fayda sağlanması mümkün değildir.

Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri:

Kanama durdurucu ajanlar, antienflamatuar ajanlar, greft-membran materyali, periodontal patlar gerekli durumlarda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Lokal anestezi ajanları ile

bilgi **lokal anestezi** bölümünde anlatılmıştır. **Sağlığınız için kritik olan yaşam önerileri:**

Önden dikiş atılır, dikişler alınmaz. Antibiyotik, ağrı kesici, gargara kullanılır. Önerilerin dikkate alınması ve hasta uyumu çok önemlidir.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir:

Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi, ADSH veya ADSM başvurulabilir. Mesai dışı saatlerde açık olan ADSM'lere başvurulabilir.

Kalite Yönetim Sistemi Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSÜZ belgedir. ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

2-KRON BOYU YÜKSELTME

İşlemi Kim, Nerede, Ne Şekilde, Nasıl Uygular:

Diş Hekimi Diş Kliniğinde, steril malzemeler ile cerrahi kurallara uygun bistüri veya lazer ile işlem yapılır. Lokal anestezi altında protez yapılacak dişlerin etrafında fazla diş eti olduğunda bu diş etinin uzaklaştırılması işlemidir. İşlemden sonra önerileri dikkate almaları ve yara bölgesini koruması çok önemlidir. Uygulama Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri gözetiminde Stajyer Diş Hekimleri tarafından da yapılabilir.

İşlemin Tahmini Süresi: 15-45 dk olabilir.

İşlemden Beklenen Faydalar: Daha fonksiyonel, estetik ve uzun vadeli bir sabit protezin yapılması.

Varsa İşlemin Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri; bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri: Alternatif tedavi yoktur.

İşlemin Riskleri ve Muhtemel Komplikasyonlar:

Ağrı, şişlik, enfeksiyonun yayılması, dişlerde ve çevre dokularda his kaybı, komşu dişte harabiyet, diş/dişlerin kırılması, dişin veya kırık parçanın değişik anatomik lokalizasyonlara iletilmesi, diş eti ve mukoza yaralanmaları, alveoler kemiğin kırılması, çenenin çıkması/kırılması, solunum yoluna diş veya yabancı cisim kaçması sinirlerin geçici/kalıcı zarar görmesi, sinüsün perfore olması, çene eklemine travmaya uğraması, çene açmada kısıtlılık (tirismus), çenede ve ağız kenarlarında ezikler ve morluklar.

Hastalığın Muhtemel Sebepleri ve Nasıl Seyredeceği: Dişin aşınması, kırılması, etrafındaki diş etinin eski proteze, sistemik hastalıklara, travmaya bağlı büyümesidir. Yapılmazsa sabit protez yapılamaz.

İşlemin Reddedilmesi Durumunda Ortaya Çıkabilecek Muhtemel Fayda ve Riskler Sonuçlar:

Fonksiyonel, estetik ve uzun vadeli bir sabit protezin yapılması güçleşir veya sabit protez yapılamaz.

Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Kanama durdurucu ajanlar, antienflamatuar ajanlar, periodontal patlar gerekli durumda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.

Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri:Diş Fırçalama, ip arayüz bakımı ve yazılan ilaçların kullanımı.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir: Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi, ADSH veya ADSM'lere; mesai dışı saatlerde açık olan ADSM'lere başvurulabilir.

Yukarıda Belirtilen İşlemleri Kabul Ettiğinizi “Okudum-Anladım-Onaylıyorum” İbaresini Kendi El Yazınızla Yazarak Onaylayınız.

Hasta veya Hastanın Yasal Temsilcisinin Adı Soyadı:	İmzası:	Bilgilendirmeyi ve İşlemi Gerçekleştirenin: Adı Soyadı/Kaşesi: Tarih, Saat, İmzası:
(Yakınlık Derecesini Belirtiniz).....		