

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	SABİT PROTEZ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM(RIZA) FORMU			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu HD.FR.50	Yayın tarihi 27.10.2017	Revizyon No 2	Revizyon tarihi 10.01.2025	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/2

Diş Hekiminin Tedavi öncesi ve sırasında genel tıbbi durumunuzu bilmesi hayati önem arz etmektedir. Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan bir rahatsızlığınız var ise; kutucuklara çarpı (X) işareti koyunuz

İlaç Alerjisi		Kalp-Damar Hast.	
Tansiyon		Diabet	
Kan hastalığı		Kanser Tedavisi	
AIDS, Zührevi Hst.		Radyoterapi	
Astım		Hepatit	
Epilepsi		Böbrek Hast.	

Bu formda kliniğimizde size ve yakınınıza yapmış olduğumuz muayene ve tetkikler sonucunda planlanan tedavi ve işlemler belirtilmiş olup; onay vermeniz halinde uygulanacaktır.

İŞLEM YAPILACAK DİŞ/DİŞLER													
8 7 6 5 4 3 2 1							1 2 3 4 5 6 7 8						
8 7 6 5 4 3 2 1							1 2 3 4 5 6 7 8						

1- LOKAL ANESTEZİ

İşlemi Kim, Nerede, Ne Şekilde, Nasıl Uygular: Diş Hekimi tarafından, Diş kliniğinde, steril malzemeler ile cerrahi kurallara göre uygulanır. Uygulama Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri tarafından klinikte yapılacaktır. Uygulama Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri gözetiminde Stajer Diş Hekimleri tarafından' da yapılabilir.

İşlemin tahmini süresi: 10-30 saniyedir.

İşlemden beklenen faydalar: Ağrıyı ortadan kaldırmak veya azaltmak, kanama kontrolü ve teşhis amaçlı uygulanır.

Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri (alternatifi) ; bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri: Lokal anestezinin alternatifi yoktur.

İşlemin riskleri ve muhtemel komplikasyonları: Enfeksiyon, kanama, ilaç ve alerjik reaksiyonlar, kan pıhtılaşması, duyu kaybı, geçici kas spazmları ve yüz felci, kol ve bacakta fonksiyon kaybı, felç, beyin hasarı, kalp krizi ve ölüm riskleri vardır. Açlık var ise bazen bayımlara neden olabilir. Lokal anestezide duyarlılık, sistemik bir hastalık, ya da sürekli kullanılan bir ilaç var ise belirtilmelidir.



Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği: Uyuşukluğunuz 15-20 dk sonra başlar. Yaklaşık 3-4 saat içerisinde geçer.

İşlemin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler sonuçları: İşlem sırasında ağrı hissedilir ve sonrasında kanama riski artabilir veya işlem yapılamayabilir.

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri: Anestezinin içindeki etken madde veya adrenalinin alerjik reaksiyonlar veya kalp damar sistemi üzerine etkileri ortaya çıkabilir. Hastanın genel tıbbi durumuna göre lokal anestezi seçimi veya doz ayarlaması hekim tarafından veya ilgili uzman hekimin konsültasyonuna göre belirlenir.

Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Uyuşukluk süresince dudağınızı ve yanağınızı ısırmayınız. 24 saat içinde vücuttan anestezik madde atılacaktır.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir: Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği fakültesi, ADSH, ADSM veya devlet hastaneleri diş polikliniklerine, Mesai dışı saatlerde açık olan ADSM'lere başvurulabilir.

2- SABİT PROTEZ

İşlemi Kim, Nerede, Ne Şekilde, Nasıl Uygular: Diş Hekimi tarafından, Diş kliniğinde, steril malzemeler ile protetik kurallara uygun olarak dişlerin yeniden şekillendirilmesi sonucu eksik dişlerin ve kaybolan estetiğin yerine konulmasıdır. Uygulama Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri gözetiminde Stajer Diş Hekimleri tarafından' da yapılabilir.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	SABİT PROTEZ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM(RIZA) FORMU			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu HD.FR.50	Yayın tarihi 27.10.2017	Revizyon No 2	Revizyon tarihi 10.01.2025	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2/2

2-SABİT PROTEZ

İşlemin Tahmini Süresi: Kurumumuzda sabit protezler provalarda herhangi bir problem olmadığında 20 iş gününde takılabilmektedir.

İşlemden Beklenen Faydalar: Yapılan kron/köprü protezi sayesinde çiğneme estetikte kolaylık ve rahatlık sağlanacaktır..

Sabit kron protezi: Tek bir diş üzerine yapılan protez tipi kronudur. Dişteki harabiyet dolguyla tedavi edilemeyecek kadar büyükse, diş belli oranlarda küçültülür ve ölçü alınır.

Sabit köprü protezi: bir veya birden fazla dişin eksik olduğu durumlarda fonksiyon ve estetiğin iadesi için yapılır. Doğal dişlerden destek alınarak tıpkı köprü gibi birleştirilerek yapılan protez tipidir.

Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri (alternatifi) ; bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri: İşlemin alternatifleri bazı durumlarda hareketli protez veya implant tedavisidir.

Olası Riskler ve Komplikasyonlar: Dişler küçültüldükten sonra kesik dişte hassasiyet/acı olabilir. Mevcut eski protezlerin sökümü zor bir işlemdir. Söküm sırasında dişler/protezler kırılabilir. Takılan dişler bir süre daha hassasiyet/acı yapabilir. Tedavi sonrasında sıcak, soğuk veya tatlı yiyeceklere karşı geçici veya kalıcı hassasiyet oluşabilir. Protez yapılan dişlerin çevresinde hijyen yetersiz olursa çürük gelişebilir. Protez çevresinde diş eti şişliği, kanama veya çekilme gibi problemler oluşabilir. Diş hazırlığı sırasında dişin sinir dokusu zarar görebilir. Bu durumda kanal tedavisi gerekebilir. Post yerleştirilmesi esnasında dişte perforasyon oluşabilir, vida kırılabilir ve diş çekime gidebilir. Protez, dişlerinizle veya karşıt dişlerle tam uyum sağlamayabilir. Bu durum çiğneme sırasında rahatsızlığa yol açabilir ve düzeltme gerektirebilir. Protez, aşırı çiğneme kuvvetleri veya kazalar

nedeniyle kırılabilir. Yapıştırılmış protezlerde, zamanla yapıştırıcı malzeme etkisini kaybedebilir ve protez gevşeyebilir. Protezin rengi doğal dişlerinizle tam uyum göstermeyebilir. Uzun süreli kullanımda renk değişikliği meydana gelebilir. Protezin çevresinde yeterli hijyen sağlanmazsa enfeksiyon, kötü koku veya diş kaybı riski oluşabilir.

Tedavi Başarısını Etkileyebilecek Durumlar:

Ağız hijyeninizin düzenli ve yeterli olması gereklidir. Diş sıkma veya gıcırdatma (bruksizm) alışkanlığınız varsa, protezin ömrü kısalsabilir. Sigara kullanımı veya sistemik hastalıklar (ör. diyabet) tedavi sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Protezlerinizi düzenli olarak kontrol ettirmek tedavi başarısı için önemlidir.

Hastalığın Muhtemel Sebepleri ve Nasıl

Seyrecedeği: Kötü diş fırçalama sonucu oluşan diş eti hastalıkları ve çürükler sebebiyle diş kaybı oluşmakta ve sabit protez ihtiyacı doğurmaktadır.

İşlemin reddedilmesi durumunda ortaya

çıkabilecek muhtemel fayda ve risk sonuçları: Çiğneme ve konuşmada güçlük ayrıca estetik problemler ve diş kaybı oluşabilir.

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri: İlaç kullanılmaz.

Sağlığınız için kritik yaşam tarzı önerileri: Dişler ve protezler düzenli olarak fırçalanmalıdır.

Köprülerde gövde altları diş ipiyle temizlenmelidir. Sigara, çay ve kahve renklenmelere sebep olabilir.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir: Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği fakültesi, ADŞH, ADŞM veya devlet hastaneleri diş polikliniklerine, Mesai dışı saatlerde açık olan ADŞM'lere başvurulabilir.

Hasta veya Hastanın Yasal Temsilcisinin Adı Soyadı: (Yakınlık Derecesini Belirtiniz)	İmzası:	Bilgilendirmeyi ve İşlemi Gerçekleştirenin: Adı Soyadı/Kaşesi: Tarih, Saat, İmzası:
--	---------	---

Yukarıda Belirtilen İşlemleri Kabul Ettiğinizi “Okudum-Anladım-Onaylıyorum” İbaresini Kendi El Yazınızla Yazarak Onaylayınız.....