

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	HAREKETLİ PROTEZ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) FORMU			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu HD.FR.53	Yayın tarihi 07.11.2017	Revizyon No 2	Revizyon tarihi 10.01.2025	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/2

Diş Hekiminin Tedavi öncesi ve sırasında genel tıbbi durumunuzu bilmesi hayati önem arz etmektedir. Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan bir rahatsızlığınız var ise;

İlaç Alerjisi	Kutucuklara çarpmı (X)	Kalp-Damar Hast.	İsareti
Tansiyon		Diabet	
Kan hastalığı		Kanser Tedavisi	
AIDS, Zührevi Hst.		Radyoterapi	
Astım		Hepatit	
Epilepsi		Böbrek Hast.	

Bu formda kliniğimizde size ve yakınınıza yapmış olduğumuz muayene ve tetkikler sonucunda planlanan tedavi ve işlemler belirtilmiş olup; onay vermeniz halinde uygulanacaktır.

İŞLEM YAPILACAK DİŞ/DİŞLER															
8 7 6 5 4 3 2 1								1 2 3 4 5 6 7 8							
8 7 6 5 4 3 2 1								1 2 3 4 5 6 7 8							

1-LOKAL ANESTEZİ

İşlemi kim, nerede, ne şekilde, nasıl uygular: Diş Hekimi tarafından, Diş kliniğinde, steril malzemeler ile cerrahi kurallara göre uygulanır.

İşlemin tahmini süresi: 10-30 saniyedir.

İşlemden beklenen faydalar : Ağrıyı ortadan kaldırmak veya azaltmak, kanama kontrolü ve teşhis amaçlı uygulanır.

Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri (alternatifi); bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri: Lokal anestezinin alternatifi yoktur.

İşlemin riskleri ve muhtemel komplikasyonları: Enfeksiyon, kanama, ilaç ve alerjik reaksiyonlar, kan pıhtılaşması, duyu kaybı, geçici kas spazmları ve yüz felci, kol ve bacakta fonksiyon kaybı, felç, beyin hasarı, kalp krizi ve ölüm riskleri vardır. Açlık var ise bazen bayılmalara neden olabilir. Lokal anesteziye duyarlılık, sistemik bir hastalık, ya da sürekli kullanılan bir ilaç var ise belirtilmelidir

BARKOD

Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyreder: Uyuşukluğunuz 15-20 dk sonra başlar. Yaklaşık 30 dakika içerisinde geçer.

İşlemin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler sonuçları: İşlem sırasında hissedilir ve sonrasında kanama riski artabilir veya yapılamayabilir.

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri: Anestezi içindeki etken madde veya adrenalinin alerjik reaksiyona veya kalp damar sistemi üzerine etkileri ortaya çıkmaz. Hastanın genel tıbbi durumuna göre lokal anestezi seçimi doz ayarlaması hekim tarafından veya ilgili uzman hekim konsültasyonuna göre belirlenir.

Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Uyuştürücü süresince dudagınızı ve yanağınızı ısırmayınız. 24 saat vücuttan anestezi madde atılacaktır.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılır: Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi, ADASM veya Devlet Hastaneleri Diş Polikliniği başvurulabilir.

2- HAREKETLİ PROTEZ

İşlemi Kim, Nerede, Ne Şekilde, Nasıl Uygulanır: Hekimi tarafından poliklinikte hastanın ağız ölçüsü laboratuvara gönderilmesiyle başlayan süreç aşamaların prova edilmesi ve hekimin son protezleri onaylamasıyla bitime göndermesi ile tamamlanır. Biten protezler laboratuvardan kliniklere hastaya uygulanır.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	HAREKETLİ PROTEZ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) FORMU			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu HD.FR.53	Yayın tarihi 07.11.2017	Revizyon No 2	Revizyon tarihi 10.01.2025	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2/2

2 HAREKETLİ PROTEZ

İşlemin Tahmini Süresi: Kurumumuzda hareketli protezler provalarda herhangi bir problem olmadığında 20 iş gününde takılabilmektedir.

İşlemden Beklenen Faydalar : Birden fazla dişin eksik olduğu durumlarda fonksiyon ve estetiğin iadesi için yapılır.

Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri (alternatifi) ; bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri: Alternatifi implant tedavisidir. İmplant üstü Hareketli protezlerle tutuculuk, fonksiyon ve estetik kaygılar azalır ve hasta konforu sağlanır. Ancak implant tedavisinin muhtemel riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.

İşlemin Riskleri ve Muhtemel Komplikasyonları: Yüksek derecede hasta uyumu gerektirir. Özellikle kemik kaybı çok ise tutuculuk azalacaktır.

Bölümlü protezler (ÜPP, APP, AÜTP): ağızda kalmış dişler yanında dişleri çevreleyen yumuşak dokulardan da destek almak zorundadır. Metal gövdeler ve kroşeler (teller) dili ve diğer yumuşak dokuları rahatsız edebilir. Hasta tarafından takıp çıkarılabilen protez tipidir.

Tam Protez (ATP, ÜTP, AÜTP): Tüm dişler eksik olduğunda yapılır. Hareketli protezler yapıldıktan sonra yumuşak dokuda vuruklar oluşabilir. Bunlar yapılan kontrollerde düzeltilerek bir süre sonra protez daha rahat kullanılabilir. Yemeklerden sonra protezleri yıkamak ve gece çıkarmak gerekmektedir.

Hastalığın Muhtemel Sebepleri ve Nasıl Seyredeceği: Kötü ağız bakımı sonucu kaybedilen dişler sebeptir. Fazla diş kaybı olduğunda hareketli protez kullanmak gerekir.

İşlemin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve risk sonuçları: Hareketli protez yapılmaz ise; çiğneme, konuşma gibi fonksiyonlar gerektiği gibi yapılamaz ve estetik problemler ortaya çıkar. Alternatifi implant tedavisidir. İmplant üstü Hareketli protezlerle tutuculuk, fonksiyon ve estetik kaygılar azalır ve hasta konforu sağlanır.

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri: İlaç kullanılmaz. Lokal anestezi ajanları ile ilgili bilgiler Lokal anestezi bölümünde anlatılmıştır.

Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Diş ve protezler fırçalanmalı, protezler temizlenerek gece suyun içinde bekletilmeli ve sabah temiz ağıza temiz olarak takılmalıdır.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir: Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği fakültesi, ADSH veya ADSM' lere ;mesai dışında açık olan ADSM'lere başvurulabilir.

Yukarıda Belirtilen İşlemleri Kabul Ettiğinizi “Okudum-Anladım-Onaylıyorum” İbaresini Kendi El Yazınızla Yazarak Onaylayınız.

Hasta veya Hastanın Yasal Temsilcisinin Adı Soyadı: (Yakınlık Derecesini Belirtiniz).....	İmzası:	Bilgilendirmeyi ve İşlemi Gerçekleştirenin: Adı Soyadı/Kaşesi: Tarih, Saat, İmzası:
---	---------	---