

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	PROTETİK CERRAHİ (PROTEZ ÖNCESİ VE PROTEZ SONRASI CERRAHİ) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) FORMU			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu HD.FR.55	Yayın tarihi 07.11.2017	Revizyon No 2	Revizyon tarihi 10.01.2025	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/2

Diş Hekiminin Tedavi öncesi ve sırasında genel tıbbi durumunuzu bilmesi hayati önem arz etmektedir. Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan bir rahatsızlığınız var ise; kutucuklara çarpı (X) işareti koyunuz.

İlaç Alerjisi		Kalp-Damar Hast.	
Tansiyon		Diabet	
Kan hastalığı		Kanser Tedavisi	
AIDS, Zührevi Hst.		Radyoterapi	
Astım		Hepatit	
Epilepsi		Böbrek Hast.	

Bu formda kliniğimizde size ve yakınınıza yapmış olduğumuz muayene ve tetkikler sonucunda planlanan tedavi ve işlemler belirtilmiş olup; onay vermeniz halinde uygulanacaktır.

İŞLEM YAPILACAK DİŞ/DİŞLER													
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6

1-LOKAL ANESTEZİ

İşlemi kim, nerede, ne şekilde, nasıl uygular: Diş Hekimi tarafından, Diş kliniğinde, steril malzemeler ile cerrahi kurallara göre uygulanır.

İşlemin tahmini süresi: 10-30 saniyedir.

İşlemden beklenen faydalar : Ağrıyı ortadan kaldırmak veya azaltmak, kanama kontrolü ve teşhis amaçlı uygulanır.

Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri (alternatifi); bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri: Lokal anestezinin alternatifi yoktur.

İşlemin riskleri ve muhtemel komplikasyonları: Enfeksiyon, kanama, ilaç ve alerjik reaksiyonlar, kan pıhtılaşması, duyu kaybı, geçici kas spazmları ve yüz felci, kol ve bacakta fonksiyon kaybı, felç, beyin hasarı, kalp krizi ve ölüm riskleri vardır. Açlık var ise bazen bayılmalara neden olabilir. Lokal anestezide duyarlılık, sistemik bir hastalık, ya da sürekli kullanılan bir ilaç var ise belirtilmelidir

BARKOD

Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği: Uyuşukluğunuz 15-20 dk sonra başlar. Yaklaşık 3-4 saat içerisinde geçer.

İşlemin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler sonuçlar: İşlem sırasında ağrı hissedilir ve sonrasında kanama riski artabilir veya işlem yapılamayabilir.

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri: Anestezinin içindeki etken madde veya adrenalinin alerjik reaksiyonlar veya kalp damar sistemi üzerine etkileri ortaya çıkabilir. Hastanın genel tıbbi durumuna göre lokal anestezi seçimi veya doz ayarlaması hekim tarafından veya ilgili uzman hekimin konsültasyonuna göre belirlenir.

Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Uyuşukluk süresince dudağınızı ve yanağınızı ısırmayınız. 24 saat içinde vücuttan anestezik madde atılacaktır.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir: Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi, ADSH, ADSM veya Devlet Hastaneleri Diş Polikliniklerine başvurulabilir.

2- PROTETİK CERRAHİ (PROTEZ ÖNCESİ VE PROTEZ SONRASI CERRAHİ)

İşlemi Kim, Nerede, Ne Şekilde, Nasıl Uygular: Çene cerrahi Uzmanı tarafından diş kliniğinde steril malzemeler kullanılarak kurallara uygun olarak lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

İşlemin Tahmini Süresi: 5-60 dakika olabilir.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	PROTETİK CERRAHİ (PROTEZ ÖNCESİ VE PROTEZ SONRASI CERRAHİ) BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) FORMU	 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ		
Kodu HD.FR.55	Yayın tarihi 07.11.2017	Revizyon No 2	Revizyon tarihi 10.01.2025	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2/2

2- PROTETİK CERRAHİ (PROTEZ ÖNCESİ VE PROTEZ SONRASI CERRAHİ)

İşlemden Beklenen Faydalar: Protez yapımı için uygun olmayan ağız içi yumuşak ve sert dokuların ve çene kemiğinin ideal anatomik duruma getirilmesidir.

Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri (alternatifi); bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri:

Alternatifi yoktur.

İşlemin Riskleri Ve Muhtemel Komplikasyonları:

Ağrı, şişlik, enfeksiyonun yayılması, diş eti ve mukoza yaralanmaları, çenenin çıkması/kırılması, solunum yoluna diş veya yabancı cisim kaçması, çene ekleminin travmaya uğraması, çenede ve ağız kenarlarında ezikler ve morluklar. İmplantın çene kemiğinden çıkması, implantın vidasının üstünün kemikle kapanması

Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği: Protezin oluşturduğu vurukların zamanında alınmamasına bağlı olarak oluşan yumuşak doku büyümeleri.

İşlemin reddedilmesi Durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler Sonuçlar:

Ağrı, şişlik, Ağız boşluğundaki dokuları etkileyen patolojik veya fizyolojik değişimler sonucunda ideal bir protez yapımının güçleşmesi ve çenelerde kemik kayıpları olabilmektedir.

Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Protezin kenar uzunluklarına bağlı olan vuruklar zamanında alınmalı ve geceleri protezler çıkartılmalıdır. Protez öncesi desteksiz dokuların alınarak uygun koşulların oluşturulmasının sağlanması.

Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri : İşlem sırasında herhangi bir ilaç uygulaması olmamakla birlikte Kanama durdurucu ajanlar, antienflamatuar ajanlar gerekli durumlarda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı allerjik reaksiyon gelişebilir. Lokal anestezi ajanlar ile ilgili bilgiler Lokal anestezi bölümünde anlatılmıştır.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabilir: Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği fakültesi, ADSH veya ADSM'lere; mesai dışı saatlerde açık olan ADSM'lere başvurulabilir.

Yukarıda Belirtilen İşlemleri Kabul Ettiğinizi **“Okudum-Anladım-Onaylıyorum”** İbaresini Kendi El Yazınızla Yazarak Onaylayınız.

Hasta veya Hastanın Yasal Temsilcisinin Adı Soyadı:(Yakınlık Derecesini Belirtiniz).....	İmzası:	Bilgilendirmeyi ve İşlemi Gerçekleştirenin: Adı Soyadı/Kaşesi: Tarih, Saat, İmzası:
--	---------	---